

トラスツズマブ療法を受けられる方へ

外科 ID: 様

担当薬剤師

【投与スケジュール】

☐		1 日目	2～7 日目
☐	トラスツズマブ BS	○	

☐		1 日目	2～21 日目
☐	トラスツズマブ BS	○	

☆検査の結果によりスケジュールや投与量が変わることがあります。

【点滴内容】

生食	50mL
ポラミン	5mg
ガスター	20 mg
デキサート	6.6mg

15 分

生食 50mL

15 分

生食 250mL
トラスツズマブ mg

初回 90 分
2 回目以降 30 分

生食 50mL

15 分

←← 初回のみ投与します

ポラミン
ガスター
デキサート } : アレルギー症状を抑える薬です。
(初回のみ投与します。)

トラスツズマブ BS*: がん細胞の増殖を抑える薬です。

※トラスツズマブ BS はハーセプチンのバイオシミラーです。
バイオシミラーについては別紙を参照してください。



【主な副作用と対策】

インフュージョン・リアクション：トラスツズマブ BS の点滴を始めてから、発熱・悪寒・吐き気・頭痛・疼痛・痒み・発疹・咳・胸の重苦しさなどのアレルギーに似た症状が起こることがあります。違和感があるようでしたら知らせてください。



心障害：薬の影響で心臓に負担がかかることがあります。



間質性肺炎：非常に稀ですが、薬の影響で肺炎が起こることがあります。咳・発熱・息切れといった症状が続くようでしたらお知らせください。



【内服薬について】

*** この治療を受けられる方には、副作用対策として内服薬が処方されることがあります。**

□ **ロキソプロフェン Na 錠**：

発熱時・疼痛時 1 回 1 錠 内服

解熱鎮痛剤です。熱や痛みでつらいときに内服してください。

続けて内服する場合には、最低 6 時間空けましょう。



【日常生活で注意していただきたいこと】

- ① 抗がん薬は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。抗がん薬投与後 2 日間(48 時間)は、トイレのふたを閉めて水を 2 回流しましょう。男性の方は尿の飛び散りを防ぐために座って排尿しましょう。
- ② ご家族が吐物や排泄物を処理する場合には必ず手袋をしましょう。汚染したゴミはビニール袋に入れて口元をしっかりと閉じてから廃棄してください。



副作用の全てが現れるわけではありません。

また、これら以外の副作用が現れる場合もあります。

気になる症状がありましたら必ず医師・薬剤師・看護師にご相談ください。

この説明書はかかりつけ医やかかりつけ薬局薬剤師にもお見せください。



お薬に関する相談先

北信総合病院 (代表) 0269-22-2151
薬剤部 医薬品情報管理室 内線 2530

