

dose-denseTC+アバスチン療法を受けられる方へ

担当薬剤師

婦人科 ID: _____ 様

【投与スケジュール】


	1日目	2~7日	8日目	9~14日	15日目	16~21日
パクリタキセル	○		○		○	
カルボプラチン	○					
アバスチン	○					

☆3週間ごとに繰り返し投与します。


☆検査の結果によりスケジュールや投与量が変わることがあります。

【点滴内容】

~1日目~



~8・15日目~



プロイメンド：吐き気を抑える薬です。

アロキシ：吐き気を抑える薬です。

ポララミン：アレルギー症状を抑える薬です。

デキサート：吐き気やアレルギー症状を抑える薬です。

ガスター：アレルギー症状を抑える薬です。

胃酸を抑える働きもあります。

パクリタキセル

カルボプラチン

アバスチン

：がん細胞の増殖を抑える薬です。

味覚障害：食べ物の味が変わって感じる場合があります。
治療が終了すれば徐々に治ります。



口内炎：食後に歯磨きをするなど、口の中は清潔に保っておきましょう。

便秘：水分を摂取したり、お腹のマッサージをしましょう。下剤や便を軟らかくする薬も使います。

下痢：下痢をしている間は脱水にならないように水分を摂取しましょう。

腎・肝障害：お薬によって腎臓や肝臓に影響が出る場合があります。

心障害：薬の影響で心臓に負担がかかる場合があります。



間質性肺炎：非常に稀ですが、薬の影響で肺炎が起こることがあります。
咳・発熱・息切れといった症状が続くようでしたらお知らせください。

腸管穿孔：稀ですが腸に穴があいてしまうことがあります。今までに経験したことのないようなお腹痛みがある場合には、我慢せず、病院へ連絡してください。

創傷治癒遅延：お薬の影響で傷が治りにくくなっていますので、怪我には十分注意しましょう。

血栓症：血栓ができやすくなっています。足がむくんだり、痛くなったり、突然息切れがするようなことがありましたら知らせてください。

粘膜からの出血：血が止まりにくくなっています。怪我には十分注意しましょう。圧迫止血などをしていても血が止まらない場合には連絡してください。

高血圧：血圧が高くなる場合があります。もともと血圧を下げる薬を飲んでいる方は特に注意してください。自宅での血圧測定をお勧めします。



たんぱく尿：おしっこにたんぱくが混じることがあります。

パクリタキセルのアルコールについて：お薬にアルコールが含まれています。
投与後は車の運転を控えましょう。




【内服薬について】

*** この治療を受けられる方には、副作用対策として内服薬が処方されます。**

デカドロン錠 4mg：1日2回 1回1錠 朝・昼食後
(抗がん剤投与翌日・翌々日の2日間内服)
吐き気止めです。



主な副作用の発現時期と程度のイメージ



【日常生活で注意していただきたいこと】

- ① 抗がん薬は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。抗がん薬投与後2日間(48時間)は、トイレのふたを閉めて水を2回流しましょう。男性の方は尿の飛び散りを防ぐために座って排尿しましょう。
- ② ご家族が吐物や排泄物を処理する場合には必ず手袋をしましょう。汚染したゴミはビニール袋に入れて口元をしっかりと閉じてから廃棄してください。



副作用の全てが現れるわけではありません。

また、これら以外の副作用が現れる場合もあります。

気になる症状がありましたら必ず医師・薬剤師・看護師にご相談ください。

この説明書はかかりつけ医やかかりつけ薬局薬剤師にもお見せください。



お薬に関する相談先

北信総合病院 (代表)0269-22-2151
薬剤部 医薬品情報管理室 内線 2530

