

胃がん

更新日：2022年2月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉 | 投与量 | 投与日 | 投与 間隔 |
|----|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 1 | 《3wHER》 トラスツズマブ | トラスツズマブ | 初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg | day1 | 21 日 |
| 2 | 《S1+CDDP》 TS1+シスプラチン | シスプラチン | 60 mg/m ² | day8 | 35 日 |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-21 | |
| 3 | 《XP》 カヘシタビン+シスプラチン | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | カペシタビン | 2000 mg/m ² | day1-14 | 21 日 |
| 4 | 《3wHER+XP》 トラスツズマブ+カヘシタビン+シスプラチン | トラスツズマブ | 初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg | day1 | 21 日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| | | カペシタビン | 2000 mg/m ² | day1-14 | |
| 5 | 《3wS1+DOC》 TS1+ドセタキセル | ドセタキセル | 40 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-14 | |
| 6 | 《3wSOX》 TS1+オキサリプラチン | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-14 | |
| 7 | 《3wCapeOX》 カヘシタビン+オキサリプラチン | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| | | カペシタビン | 2000 mg/m ² | day1-14 | |
| 8 | 《3wnab-PTX》 nab-ハク リタキセル | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 260 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| 9 | 《wnab-PTX》 nab-ハク リタキセル | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 10 | 《wPTX》 ハク リタキセル | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 11 | 《2wPTX》 ハク リタキセル | パクリタキセル | 120 mg/m ² | day1 | 14 日 |
| 12 | 《wCPT-11》 イリノテカン | イリノテカン | 100 mg/m ² | day1・8・15 | 28 日 |
| 13 | 《2wCPT-11》 イリノテカン | イリノテカン | 150 mg/m ² | day1 | 14 日 |
| 14 | 《3wDOC》 ドセタキセル | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| 15 | 《2wCPT-11+2wCDDP》 イリノテカン+シスプラチン | イリノテカン | 60 mg/m ² | day1 | 14 日 |
| | | シスプラチン | 30 mg/m ² | day1 | |
| 16 | 《2wCPT-11+4wCDDP》 イリノテカン+シスプラチン | イリノテカン | 70 mg/m ² | day1・15 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 17 | 《2wRmab+wPTX》 ラムシルマブ+ハク リタキセル | ラムシルマブ | 8 mg/kg | day1・15 | 28 日 |
| | | パクリタキセル | 80 mg/m ² | day1・8・15 | |
| 18 | 《2wRmab》 ラムシルマブ | ラムシルマブ | 8 mg/kg | day1 | 14 日 |
| 19 | 《2wオプジーボ》 ニボルマブ | ニボルマブ | 240 mg/body | day1 | 14 日 |
| 20 | 《4wオプジーボ》 ニボルマブ | ニボルマブ | 480 mg/body | day1 | 24 日 |
| 21 | 《2wRmab+wnab-PTX》 ラムシルマブ+nab-ハク リタキセル | ラムシルマブ | 8 mg/kg | day1・15 | 28 日 |
| | | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15 | |
| 22 | 《RPMI》 5-FU+レボホリナート | レボホリナート | 250 mg/m ² | day1・8・15・ 22・29・36 | 56 日 |
| | | フルオロウラシル | 600 mg/m ² | | |
| 23 | 《3wHER+S1+CDDP》 トラスツズマブ+カヘシタビン+シスプラチン | トラスツズマブ | 初回 8 mg/kg 2回目～ 6 mg/kg | day1 | 21 日 |
| | | シスプラチン | 60 mg/m ² | day1 | |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-14 | |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|
| 24 | 《2wFOLFFOX6》 オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート | レボホリナート | 200 mg/m ² | day1 | 14 日 |
| | | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | bolus 400 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | 持続 2400 mg/m ² | day1 (~46hr) | |
| 25 | 《2wオプジーボ®+mFOLFFOX6》 ニボルマブ®+オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート | ニボルマブ | 240 mg/body | day1 | 14 日 |
| | | レボホリナート | 200 mg/m ² | day1 | |
| | | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | bolus 400 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | 持続 2400 mg/m ² | day1 (~46hr) | |
| 26 | 《3wオプジーボ®+SOX》 ニボルマブ®+TS1+オキサリプラチン | ニボルマブ | 360 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day1 | |
| | | S-1 | 80 mg/m ² | day1-14 | |
| 27 | 《3wオプジーボ®+CapeOX》 ニボルマブ®+カペシタビン+オキサリプラチン | ニボルマブ | 360 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | day1 | |
| | | カペシタビン | 2000 mg/m ² | day1-14 | |

食道がん

更新日：2022年2月
北信総合病院薬剤部

| | レジメン名 | 薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉 | 投与量 | 投与日 | 投与 間隔 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 《4wFP》5-FU+シスプラチン | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | day1-5 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |
| 2 | 《4wFP+RT》 5-FU: 700mg/m ² +シスプラチン: 70mg/m ² +放射線 | フルオロウラシル | 700 mg/m ² | day1-4 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 70 mg/m ² | day1 | |
| 3 | 《4wFP+RT》 5-FU: 1000mg/m ² +シスプラチン: 75mg/m ² +放射線 | フルオロウラシル | 1000 mg/m ² | day1-4 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 75 mg/m ² | day1 | |
| 4 | 《3wDOC》ドセタキセル | ドセタキセル | 70 mg/m ² | day1 | 21 日 |
| 5 | 《4wアクトラ》ネダプラチン | ネダプラチン | 100 mg/m ² | day1 | 28 日 |
| 6 | 《4wDCF》ドセタキセル+シスプラチン+5-FU | フルオロウラシル | 600 mg/m ² | day1-5 | 28 日 |
| | | シスプラチン | 70 mg/m ² | day1 | |
| | | ドセタキセル | 60 mg/m ² | day1 | |
| 7 | 《2wオプジーボ®》ニボルマブ® | ニボルマブ | 240 mg/body | day1 | 14 日 |
| 8 | 《4wオプジーボ®》ニボルマブ® | ニボルマブ | 480 mg/body | day1 | 28 日 |
| 9 | 《wPTX》パクリタキセル | パクリタキセル | 100 mg/m ² | day1・8・15・22・29・36 | 49 日 |
| 10 | 《mFOLFFOX6》 オキサリプラチン+5-FU+レボホリナート | レボホリナート | 200 mg/m ² | day1 | 14 日 |
| | | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | bolus 400 mg/m ² | day1 | |
| | | フルオロウラシル | 持続 2400 mg/m ² | day1 (~46hr) | |
| 11 | 《3wキイトルーダ®+FP》(1-6コース) ペムブロリズマブ®+シスプラチン+5-FU | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | day1-5 | |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | day1 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|------|
| 12 | 《3wキイトル-タ° +FU》 (7コース〜以降) ハ° ムフ° ロリス° マフ° +5-FU | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| | | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | day1-5 | |
| 13 | 《3wキイトル-タ° 》 ハ° ムフ° ロリス° マフ° | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | day1 | 21 日 |
| 14 | 《6wキイトル-タ° 》 ハ° ムフ° ロリス° マフ° | ペムブロリズマブ | 400 mg/body | day1 | 42 日 |