

# フェスゴによる治療を受けられる方へ

外科 ID: \_\_\_\_\_ 様

担当薬剤師

## 【投与スケジュール】

	1日目	2～21日目
フェスゴ IN 初回のみ	○	
フェスゴ MA 2回目～	○	

☆3週間ごとに繰り返し投与します。

☆検査の結果によりスケジュールや投与量が変わることがあります。

## 【注射内容】

初回 **フェスゴ IN** 15mL

2回目～ **フェスゴ MA** 10mL

<大腿部に皮下投与>  
初回 8分  
2回目～ 5分



**フェスゴ**: がん細胞の増殖を抑える薬です。

- ・フェスゴ INにはペルツズマブ 1200mg とトラスツズマブ 600mg が含まれています。
- ・フェスゴ MAにはペルツズマブ 600mg とトラスツズマブ 600mg が含まれています。

## 【主な副作用と対策】

**アナフィラキシー様症状**: お薬を投与することで、アレルギーに似た症状が発現することがあります。息がしにくい、胸が締め付けられる、といった症状がある場合にはすぐに知らせてください。

**インフーズオン・リアクシオン**: フェスゴの皮下投与を始めてから、発熱・悪寒・吐き気・頭痛・疼痛・痒み・発疹・咳・胸の重苦しさなどのアレルギーに似た症状が起こることがあります。違和感があるようでしたら知らせてください。

**注射部位反応**: 針の刺入部の皮膚が赤くなる・腫れる・痛い・熱っぽい・かゆみが出るなどの症状が現れる場合があります。異常を感じたらすぐに知らせてください。

**発疹**：皮膚が赤くなったり、かゆみが出ることがあります。  
ひどい場合には知らせてください。  
塗り薬が処方されていますので、指示通り使用してください。



**下痢**：下痢をしている間は脱水にならないように水分を摂取しましょう。

**心障害**：薬の影響で心臓に負担がかかることがあります。



**間質性肺炎**：非常に稀ですが、薬の影響で肺炎が起こることがあります。  
咳・発熱・息切れといった症状が続くようでしたらお知らせください。

### 【日常生活で注意していただきたいこと】

- ① 抗がん薬は投与後しばらくの間、尿や便に残ります。抗がん薬投与後2日間(48時間)は、トイレのふたを閉めて水を2回流しましょう。男性の方は尿の飛び散りを防ぐために座って排尿しましょう。
- ② ご家族が吐物や排泄物を処理する場合には必ず手袋をしましょう。  
汚染したゴミはビニール袋に入れて口元をしっかりと閉じてから廃棄してください。



副作用の全てが現れるわけではありません。  
また、これら以外の副作用が現れる場合もあります。  
気になる症状がありましたら必ず医師・薬剤師・看護師にご相談ください。  
この説明書はかかりつけ医やかかりつけ薬局薬剤師にもお見せください。



#### お薬に関する相談先

北信総合病院 (代表)0269-22-2151  
薬剤部 医薬品情報管理室 内線 2530

