

膵がん

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《wGEM》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8・15	28 日
2	《2wGEM》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1	14 日
3	《3wGEM (d1, 8) 》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8	21 日
4	《S1+GEM (d8, 15) 》 TS1+ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day8・15	21 日
		S-1	80 mg/m ²	day1-14	
5	《S1+GEM+CDDP》 TS1+ゲムシタビン+シスプラチン	ゲムシタビン	200 mg/body	day1・8	21 日
		シスプラチン	10 mg/body	day1・8	
		S-1	100 mg/m ²	day1-14	
6	《4wnab-PTX+GEM》 nab-パクリタキセル+ゲムシタビン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125 mg/m ²	day1・8・15	28 日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8・15	
7	《2wFOLFIRINOX》 オキサリプラチン+イリノテカン+5-FU+レボホリナート	オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1	14 日
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1	
		イリノテカン	180 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	bolus 400 mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル	持続 2400 mg/m ²	day1 (~46hr)	

胆道がん

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《wGEM》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8・15	28 日
2	《2wGEM》 ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1	14 日
3	《GEM+CDDP》 ゲムシタビン+シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m ²	day1	14 日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1	
4	《GC (day1, 8) 》 ゲムシタビン+シスプラチン	シスプラチン	25 mg/m ²	day1・8	21 日
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	day1・8	
5	《S1+GEM+CDDP》 TS1+ゲムシタビン+シスプラチン	ゲムシタビン	1000 mg/body	day1	14 日
		シスプラチン	25 mg/body	day1	
		S-1	80 mg/m ²	day1-7	

肝がん

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

	レジメン名	薬剤名（一般名） 〈斜体：内服薬〉	投与量	投与日	投与 間隔
1	《2wRmab》 ラムシルマブ	ラムシルマブ	8 mg/kg	day1	14 日
2	《4wFMP》 5-FU+ミトキサントロン+シスプラチン	フルオロウラシル	450 mg/m ²	day1-5	28 日
		ミトキサントロン	6 mg/m ²	day1	
		シスプラチン	80 mg/m ²	day1	