

TC療法を受けられる方へ

担当薬剤師

外科 ID: _____ 様


【投与スケジュール】

	1日目	2～21日目
エンドキサン	○	
ドセタキセル	○	

☆3週間ごとに繰り返し投与します。

☆検査の結果によりスケジュールや投与量が変わることがあります。

【点滴内容】



デキサート：吐き気やアレルギー症状を抑える薬です。

グラニセトロン：吐き気を抑える薬です。

エンドキサン
ドセタキセル } : がん細胞の増殖を抑える薬です。



【主な副作用と対策】

アナフィラキシー様症状：お薬を投与することで、アレルギーに似た症状が発現することがあります。息がしにくい、胸が締め付けられる、といった症状がある場合にはすぐに知らせてください。

血管外漏出：針の刺入部の皮膚が赤くなる・腫れる・痛い・熱っぽい・かゆみが出るなどの症状が現れる場合があります。異常を感じたらすぐに知らせてください。

白血球減少：投与後 7～14 日頃に最も減少すると言われています。

白血球が少なくなると、病原菌に対する体の抵抗力が弱くなり、
風邪などの感染症を起こしやすくなりますので、
うがい・手洗い・マスクといった感染予防を心がけましょう。



赤血球減少：血液の赤い成分が減少することで、めまいやふらつき、疲れやすくなるといった副作用が起こることがあります。十分な休息をとりましょう。

血小板減少：投与後 7～21 日頃に最も減少すると言われています。原因不明のあざ・鼻血・歯茎からの出血・頭痛などが起こることがあります。出血しやすくなりますので、怪我や転倒には注意してください。


食欲不振・悪心・嘔吐：投与後～7 日ほど現れることがあります。あらかじめ吐き気止めを投与していますが、他の薬もありますのでつらい時には申し出てください。また、食事にはおいの少ないもの・冷たいもの・食べられるものを少しずつ、食べられる分だけ摂取するようにしましょう。



脱毛：投与後 14～21 日経つと抜け始めます。
治療終了後 6 ヶ月ほどで生えそろってきます。



色素沈着・爪の変形：皮膚や爪の色が着色したり、爪が変形してしまうことがあります。
長い時間直射日光にあたらないようにしましょう。
治療が終了すれば徐々に元に戻ります。



末梢神経障害：手足がしびれたり、痛みがでることがあります。ボタンがかけにくい・字が書きにくいといった症状が出てくるようでしたらお知らせください。

浮腫：手足や顔がむくむことがあります。体重の変化に注意しましょう。
予防にデカドロンというお薬を内服します。



筋肉痛・関節痛：投与 2～3 日後に肩や背中、腰、腕などの筋肉が痛くなったり、関節が痛くなることがあります。一過性のものですが、辛いときには痛み止めを使用してください。

発疹：皮膚が赤くなったり、かゆみが出ることがあります。
ひどい場合には知らせてください。
塗り薬が処方されていますので、指示通り使用してください。



出血性膀胱炎：投与後 2－3 日で、尿が近い・赤くなる・残った感じがする・排尿時痛があるといった症状が起こることがあります。十分な水分摂取をして予防しましょう。

便秘：水分を摂取したり、お腹のマッサージをしましょう。下剤や便を軟らかくする薬も使います。

下痢：下痢をしている間は脱水にならないように水分を摂取しましょう。

口内炎：食後に歯磨きをするなど、口の中は清潔に保っておきましょう。

味覚障害：食べ物の味が変わって感じる場合があります。治療が終了すれば徐々に治ります。



腎・肝障害：お薬によって腎臓や肝臓に影響が出る場合があります。

心障害：薬の影響で心臓に負担がかかる場合があります。


間質性肺炎：非常に稀ですが、薬の影響で肺炎が起こることがあります。

咳・発熱・息切れといった症状が続くようでしたらお知らせください。



卵巣機能低下：エンドキサンの影響で、生理が止まってしまうことがあります。

主な副作用の発現時期と程度のイメージ



【処方薬について】

*** この治療を受けられる方には、副作用対策として以下の薬が処方されます。**

- **デカドロン錠 4mg** : 1日1回 1回1錠 朝食後 点滴した翌日から3日間
吐き気止めです。むくみを予防する効果もあります。



- **ロキソプロフェン Na 錠** : 疼痛時 1回1錠 内服
痛み止めです。関節・筋肉・頭が痛いときに内服してください。
解熱作用もあります。



- **センノシド錠** : 便秘時 1回1~2錠 内服
下剤です。吐き気止めにより便秘になる可能性があります。
適宜調節して内服してください。
内服後8~12時間で効果が現れます。



- **ゾルピデム酒石酸塩 OD 錠 5mg** : 不眠時 1回1錠 内服
眠り薬です。
半分にして内服してもかまいません。



- **ナウゼリン OD 錠** : 吐き気時 1回1錠 内服
吐き気止めです。
食事をする場合には食前に内服したほうが効果的です。



- **ファモチジン錠 10mg** : 1日2回 1回1錠 朝食後・寝る前
胃酸の分泌を抑える薬です。



- **ヒルドイドローション** : 1日1~数回 塗布
保湿剤です。手足や顔などに塗ってください。
乾燥の気になるところにはこまめに塗ってください。



- **ロコイド軟膏** : 1日1~数回 **顔**に塗布
炎症を抑える塗り薬です。
赤くなったり、発疹が出たところにだけうすくやさしく塗ってください。



- **マイザー軟膏** : 1日1~数回 **顔以外**に塗布
炎症を抑える塗り薬です。
赤くなったり、発疹が出たところにだけうすくやさしく塗ってください。



副作用の全てが現れるわけではありません。

また、これら以外の副作用が現れる場合もあります。

気になる症状がありましたら必ず医師・薬剤師・看護師にご相談ください。



お薬に関する相談先

北信総合病院 (代表)0269-22-2151
薬剤部 医薬品情報管理室 内線 2530

